

		meses														anos		
		Nasc.	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	15	18	4-6	9-11	14	
(BCG) Tuberculose		DU																
HEXAVALENTE PENTAVALENTE	Hepatite B	D1	D2				D3											
	DTP/DTPa - Difteria, Tétano e Coqueluche		D1		D2		D3						R1		R2			
	Poliomielite		D1		D2		D3						R1					
	Haemophilus Influenzae B		D1		D2		D3						R1					
Pneumocócica conjugada 13/15			D1		D2		D3					R						
Meningocócica C conjugada/ Meningo. ACWY conjugada				D1/ D1		D2/ D2						R/R			★ R			
Meningo B				D1		D2						R						
Rotavírus			D1		D2		★ D3											
Gripe							A partir dos 6 meses de idade (anual). Na primovacinação, abaixo dos 9 anos, fazer 2 doses com intervalo de 1 mês.											
TREVA/VAL	MMR - Sarampo, Caxumba e Rubéola											D1	D2					
	Varicela											D1	D2					
	Hepatite A											D1		D2				
HPV - Vírus do Papiloma Humano	Meninos e meninas a partir dos 9 anos de idade																	
dTap - Difteria, Tétano e Coqueluche - uso adulto																R		
Febre Amarela									D1						D2			
Pneumocócica 23 - Valente															▲			
Covid-19		A partir de 6 meses de idade. Checar recomendação PNI/SUS.																
Dengue		A partir de 4 anos de idade, 2 doses com intervalo de 3 meses.																
Anticorpo monoclonal específico contra o VSR (Nirvesimabe)		Dose única para ≤ 1 ano na primeira sazonalidade. Na segunda sazonalidade, para crianças de até 2 anos com maior risco.																
DU - Dose Única		D1 - 1a dose		D2 - 2a dose		D3 - 3a dose		R1 - Reforço 1		R2 - Reforço 2								

★ De acordo com o fabricante

▲ Indicada a partir dos 2 anos de idade para grupos especiais

● Um esquema de 4 doses é recomendado para prematuros de até 2kg ou idade gestacional < 33 semanas (0, 2, 4 e meses)

Pode ser feita a partir dos 9 anos de idade. HPV 4 pode fazer esquema opcional de 1 dose ou esquema básico de 2 doses. HPV 9, esquema básico de 2 doses