

Vacinas

Doses

dT- Difteria e Tétano ou dTap- Difteria, Tétano e Coqueluche acelular	1 dose a cada 10 anos
MMR - Sarampo, Caxumba e Rubéola ¹	2 doses intervalo mínimo de 1 mês entre as doses
Varicela ¹	2 doses intervalo mínimo de 1 mês entre as doses
Hepatite A ¹	2 doses 6 meses de intervalo
Hepatite B ¹	3 doses 2ª e 3ª doses administradas 1 e 6 meses após a 1ª dose
HPV - Vírus do Papiloma Humano ²	3 doses Intervalo de 0 - 2 ³ - 6 meses.
Meningo ACWY conjugada	1 dose única ⁴
Meningocócica B	2 doses intervalo mínimo de 1 mês entre as doses
Gripe/Efluelda ⁵	1 dose anual
Pneumocócica 13/15 conjugada ^{6 e 7}	1 dose - a partir dos 60 anos
Pneumocócica 23 - Valente ^{6, 7 e 8}	2 doses intervalo de 5 anos
Herpes Zóster (Shingrix)	2 doses intervalo habitual de 2 meses entre as doses
Covid-19	Checar recomendação PNI/SUS
Dengue	2 doses com intervalo de 3 meses
Arexvy	1 dose - a partir dos 60 anos
Abrysvo	1 dose para gestantes ⁹ e pessoas 60+

1. Para não vacinados e sem registro da doença.

2. Esquema alternativo de 2 doses, autorizado para adolescentes a partir dos 9 anos.

3. Para adolescentes de 9 a 15 anos, apenas 2 doses.

4. Se a vacina for feita entre 11-15 anos, 1 dose de reforço deve ser feita a partir dos 16 anos.

5. Efluelda para pessoas com mais de 60 anos.

6. Fazer primeiro a pneumocócica conjugada e 12 meses após a pneumo 23-valente.

7. Pode ser antecipada ou necessitar de uma dose de reforço em situações especiais.

8. Para pessoas com condições clínicas especiais e para menores de 60 anos fica a critério médico.

9. Gestantes entre 24 e 36 semanas.

* Algumas vacinas podem estar especialmente recomendadas para pacientes portadores de comorbidades ou em outra situação especial.